


Назва препарату	Лікарська форма	Склад	Фармакологічні властивості	Показання до застосування
Праміпексол IC 	Таблетки №30. UA/15526/01/01 UA/15526/01/02	Склад 1 таблетки: праміпексолу дигідрохлориду моногідрату 0,25 мг / 1 мг.	Полегшує паркінсонічні рухові порушення шляхом стимуляції дофамінових рецепторів стріатуму (смугастого тіла).	Лікування симптомів ідіопатичної хвороби Паркінсона у дорослих як монотерапія або у комбінації з леводопою. Симптоматичне лікування ідіопатичного синдрому неспокійних ніг від помірного до тяжкого ступеня у дорослих.
П'ятирчатка® IC 	Таблетки №10. UA/8698/01/01	Склад 1 таблетки: метамізолу натрію моногідрату 300 мг, парацетамолу 200 мг, кофеїн-бензоату натрію 50 мг (у перерахунку на кофеїн 20 мг), фенобарбіталу 10 мг, кодеїну фосфату гемігідрату 9,5 мг (у перерахунку на кодеїн основу 7 мг).	Комбінований препарат, чинить знеболювальну, жарознижувальну та протизапальну дію.	Виражений больовий синдром різного генезу (у суглобах, м'язах, радикуліт, менструальний біль, невралгії, а також головний та зубний біль, мігрень). Застудні і пропасні стани, що супроводжуються больовими симптомами та явищами запалення.
Пенталгін IC® 	Таблетки №10. UA/8694/01/01			
Pericol IC 	Порошок для орального розчину №10. UA/14661/01/01	Склад 1 саше: натрію хлориду 3,5 г, калію хлориду 2,5 г, натрію цитрату 2,9 г, глюкози 10,0 г.	Препарат електролітів із вуглеводами для відновлення водно-електролітної рівноваги.	Відновлення водно-електролітної рівноваги, корекція ацидозу при гострій діарей. Теплові ураження, що супроводжуються порушенням водно-електролітного обміну.
Ривастигмін IC 	Капсули №30. UA/16388/01/01 UA/16388/01/02 UA/16388/01/03 UA/16388/01/04	Склад 1 капсули: ривастигміну 1,5 мг / 3 мг / 4,5 мг / 6 мг.	Інгібітор ацетилхолінестерази і бутирилхолінестерази карбаматного типу. Чинить сприятливий ефект на когнітивний дефіцит при деменції.	Симптоматичне лікування деменції від незначного до помірного ступеня, обумовленої хворобою Альцгеймера, та у пацієнтів з ідіопатичною хворобою Паркінсона.
Розувастатин IC 	Таблетки №30. UA/15855/01/01 UA/15855/01/02 UA/15855/01/03 UA/15855/01/04	Склад 1 таблетки: розувастатину 5 мг / 10 мг / 20 мг / 40 мг.	Гіполіпідемний засіб.	Лікування гіперхолестеринемії. Профілактика серцевосудинних порушень.
Теофедрин IC® 	Таблетки №10. UA/9230/01/01	Склад 1 таблетки: теофіліну безводного 100 мг, кофеїну безводного (у перерахунку на моногідрат) 50 мг, фенобарбіталу 20 мг, ефедрину гідрохлориду 20 мг, парацетамолу 200 мг, красавки (беладони) екстракту сухого 3 мг, цитизину 0,1 мг.	Комбінований препарат, що збільшує провід бронхів, розширює судини легень та збільшує серцевий кровотік.	Хронічний бронхіт, бронхіальна астма, хронічні обструктивні захворювання легень (ХОЗЛ).
Транквілар® IC 	Таблетки №20. UA/8851/01/01	Склад 1 таблетки: темгіолурилу 300 мг.	Знімає або послаблює почуття занепокоєння, тривогу, страх. Не виявляє снодійного ефекту.	Кардіалгії різного генезу, прояви при передменструальному синдромі та менопаузі. У складі комплексної терапії нікотинової залежності.
Флумібакт IC 	Таблетки вагінальні №6. UA/15786/01/01	Склад 1 таблетки: 10 мг деквалінію хлориду.	Четвертинна амонієва сполука із широким антимікробним спектром дії проти різних грампозитивних та грамнегативних бактерій, грибів та найпростіших одноклітинних організмів (Trichomonas vaginalis).	Вагінальні інфекції бактеріального та грибового походження (наприклад бактеріальний вагіноз та кандидоз). Трихомоніаз. Санация перед гінекологічними втручаннями та пологами.
Цикотин® IC 	Таблетки вкриті плівковою оболонкою №100. UA/20300/01/01	Склад 1 таблетки: цитизину 1,5 мг.	Зменшує нікотинową залежність шляхом полегшення симптомів синдрому відміни.	Лікування нікотинової залежності з метою відмови від паління без симптомів синдрому відміни.

Інформація в таблиці викладена стисло. Детальна інформація наведена в інструкції для медичного застосування.

НІКОЛИ НЕ ПІЗНО КИНУТИ КУРИТИ!




Більшості курців відмовитись від цієї звички заважає сильна нікотинова залежність і психологічна прив'язаність до ритуалів, пов'язаних з курінням. Страх перед симптомами відмови та невпевненість у собі можуть знизити шанси на успіх.

Вирішує все твердий намір кинути курити та позитивний настрій, як вважав Аллен Карр, відомий у всьому світі своєю книгою “Легкий спосіб кинути курити”.

Будьте твердими, не впадайте у відчай, а препарат ЦИКОТИН® IC допоможе більш комфортно та без надзусиль відмовитися назавжди від цієї шкідливої звички.



ЦИТИЗИН -
речовина
рослинного
походження



Не містить
нікотину



1 упаковка =
повний курс
на 25 днів



Дні		МАХ ДОБОВА ДОЗА
1-3	1 таблетка кожні 2 год.	⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖
4-12	1 таблетка кожні 2,5 год.	⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖
13-16	1 таблетка кожні 3 год.	⊖ ⊖ ⊖ ⊖
17-20	1 таблетка кожні 5 год.	⊖ ⊖ ⊖
21-25	1-2 таблетки кожен день	⊖ ⊖

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ:

- З першого дня прийому Цикотину® IC потрібно поступово припиняти куріння.
- Слід відмовитися від паління не пізніше 5-го дня від початку лікування - одночасне застосування цитизину і тютюнопаління може призводити до посилення проявів небажаних реакцій, пов'язаних із нікотиніном.
- Якщо результат незадовільний, лікування припиняється і може бути поновлене через 2 – 3 місяці.

Детальна інформація наведена в інструкції для медичного застосування.



ТДВ «ІНТЕРХІМ» Україна, 65080, м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, буд. 86
Телефон (048) 777 29 50
Ліцензія АЕ 295499
Виробництво препаратів відповідає вимогам GMP ЄС і ВООЗ.
Сертифікат 024/2023/GMP. info@interchem.com.ua
Р/п МОЗ України на лікарський засіб № UA/20300/01/01





ІНТЕРХІМ

ПРАЦЮЄМО, ЩОБ ДОПОМАГАТИ

2024

Інформація для професійної діяльності медичних та фармацевтичних працівників





Наявний каталог дійсний станом на 2024 рік. Оновлена версія каталогу з'явиться за цим посиланням у листопаді 2025 року. Щодо актуальної продукції звертайтеся за адресою pty@interchem.com.ua. Дякуємо за розуміння!



Назва препарату	Лікарська форма	Склад	Фармакологічні властивості	Показання до застосування	Назва препарату	Лікарська форма	Склад	Фармакологічні властивості	Показання до застосування	Назва препарату	Лікарська форма	Склад	Фармакологічні властивості	Показання до застосування
Алкодез® IC 	Таблетки №4. UA/12717/01/01	Склад 1 таблетки: метадоксину 0,5 г.	Антиалкогольний, дезінтоксикаційний, гепатопротекторний засіб.	Зменшення токсичної дії алкоголю. Гостра алкогольна інтоксикація (легкої та середньої тяжкості). Алкогольний абстинентний синдром.	Андифен IC 	Таблетки №10. UA/15886/01/01	Склад 1 таблетки: метамізолу натрію моногідрату 250 мг, фенобарбіталу 20 мг, папаверину гідрохлориду 20 мг, бендазолу гідрохлориду 20 мг.	Комбінований препарат з анальгезивним, спазмолітичним і судинорозширювальним ефектами, обумовленими специфічною дією його компонентів. Препарат чинить також антигіпертензивну та жарознижувальну дію.	Больовий синдром, пов’язаний зі спазмом судин або гладких м’язів внутрішніх органів; артеріальна гіпертензія.	Кардітаб IC 	Таблетки №10, №6. UA/14659/01/01 Таблетки сублінгвальні №10, №6. UA/14659/02/01	Склад 1 таблетки: фенобарбіталу 7,5 мг, етилового ефіру α-бромізовалеріанової кислоти 8,2 мг, олії м’яти 0,58 мг.	Комбінований седативний, судинорозширювальний та спазмолітичний засіб.	Неврози. Безсоння. У комплексній терапії гіпертонічної хвороби та вегето-судинної дистонії. Кардіалгія, тахікардія. Спазми кишечника.
Аміксин® IC 	Таблетки, вкриті оболонкою №3, №6, №10. UA/2559/01/01 UA/2559/01/02	Склад 1 таблетки: тилорону 125 мг (для дорослих), 60 мг (для дітей від 7 років).	Імуномодуючий та протівірусний засіб. Стимулює утворення в організмі α-, β-, γ-інтерферонів.	Дорослі. Для лікування і профілактики грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій. У складі комплексної терапії інших вірусних інфекцій. Діти старше 7 років. Лікування грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій.	Бензонал IC® 	Таблетки 0,05 г №30; UA/9793/01/01 UA/9793/01/02	Склад 1 таблетки: бензобарбіталу 50 мг /100 мг.	Протієпілетичний засіб.	Різні форми епілепсії. У складі комплексної терапії гемолітичної хвороби новонароджених.	Кардітаб® IC Фіто 	Таблетки №10 UA/15572/01/01	Склад 1 таблетки: валеріани екстракту водно-спиртового сухого 40 мг, етилового ефіру α-бромізо-валеріанової кислоти 8,2 мг, олії м’яти 0,58 мг.	Седативний, спазмолітичний, судинорозширювальний засіб. Сприяє зниженню збудливості центральної нервової системи, чинить заспокійливу дію та полегшує настання природного сну.	Підвищена нервова збудливість, безсоння. У складі комбінованої терапії при легких функціональних порушеннях з боку серцево-судинної системи.
Амілар IC 	Таблетки для розсмоктування №8, №16. UA/14892/01/01 UA/14893/01/01 UA/14891/01/01	Склад 1 таблетки: деквалінію хлориду 0,25 мг, дибукаїну гідрохлориду 0,03 мг.	Комбінований препарат, чинить бактерицидну, фунгістатичну та знеболювальну дію у ротовій порожнині.	Місцеве лікування гострих запальних захворювань ротової порожнини та горла.	Вітамін С 	Таблетки жувальні №24, №56. UA/16001/01/01 UA/16002/01/01	Склад 1 таблетки: аскорбінової кислоти 199,5 мг, натрію аскорбату 338,0 мг (у перерахунок на аскорбінову кислоту 300,5 мг).	Аскорбінова кислота бере участь в регуляції обміну вуглеводів, ліпідів та білків, впливає на метаболізм інсуліну, заліза, необхідна для синтезу проколагену, колагену та регенерації сполучної та кісткової тканин.	Забезпечення підвищеної потреби організму в аскорбіновій кислоті: • при гострих респіраторних та інших інфекційних захворюваннях; • після тяжких захворювань, оперативних втручань; • при кровотечах (носові, легеневі, маткові); • при променевій хворобі, гепатиті, холециститі.	Клофелін IC 	Таблетки №50. UA/16533/01/02	Склад 1 таблетки: клонідину гідрохлориду 0,15 мг.	Клонідин – агоніст α2-адренорецепторів, імідазолінових рецепторів, гіпотензивний засіб центральної дії, який діє на рівні нейрогуморальної регуляції судинного тонусу.	Артеріальна гіпертензія (есенціальна або вторинна) у складі комплексного лікування.
Аміфена IC 	Таблетки, вкриті оболонкою №20. UA/16620/01/01 UA/16620/01/02	Склад 1 таблетки: мефенамінової кислоти 250 мг / 500 мг.	Мефенамінова кислота — нестероїдний протизапальний засіб, який чинить протизапальну, знеболювальну і жарознижувальну дію.	Біль низької та середньої інтенсивності: м’язовий, суглобовий, травматичний, зубний, головний біль різної етіології, післяопераційний, післяпологовий. Первинна дисменорея. Дисфункціональні менорагії.	Гідазепам IC® 	Таблетки 0,02 г №20; 0,05 г №10. UA/8579/01/01 UA/8579/01/02 Таблетки сублінгвальні 0,02 г №20; 0,05 г №10. UA/8579/02/01 UA/8579/02/02	Склад 1 таблетки: гідазепаму 20 мг або 50 мг.	«Денний» транквілізатор. Після перорального прийому одноразових доз дія препарату проявляється через 30–60 хв. Після сублінгвального прийому дія проявляється через 5–15 хв.	При станах, які супроводжуються тривогою, страхом (у тому числі перед хірургічними втручаннями та болісними діагностичними обстеженнями), підвищеною дратівливістю, порушенням сну.	Левана® IC 	Таблетки 0,5 мг №20; 1 мг и 2 мг №10. UA/11175/01/01 UA/11175/01/02 UA/11175/01/03	Склад 1 таблетки: левани 0,5 мг / 1 мг / 2 мг.	Чинить виражену снодійну, анскіолітичну дію, забезпечує фізіологічний снодійний ефект.	Розлади сну різної етіології (есенціальна або вторинна) та транзиторне безсоння.
Аміцитрон® Аміцитрон® Без цукру	Порошок для орального розчину №10.	Склад 1 саше: парацетамолу 500 мг, фенілефрину гідрохлориду 10 мг, феніраміну малеату 20 мг, кислоти аскорбінової 50 мг	Жарознижувальний, беззаспокійливий, антигістамінний, судинозвужувальний препарат.	Симптоматичне лікування гострих респіраторних інфекцій та грипу; підвищеної температури тіла, головного болю, закладеності носа, нежитю, болю та ломоти у м’язах.	Гінкгоба 	Капсули №20, №60. UA/15691/01/01 UA/15691/01/02 UA/15691/01/03	Склад 1 капсули: гінкго екстракту сухого (Folium Ginkgo) (35-67:1) (екстрагент – етанол 65 %)/ (39,6-49,5:1) (екстрагент – етанол 50 %) 40 мг / 80 мг /120 мг.	Препарат збільшує кровотік, нормалізує мікроциркуляцію, підвищує переносимість гіпоксії, запобігає агрегації еритроцитів, гальмує фактор активзації тромбоцитів.	Симптоматичне лікування когнітивних розладів у пацієнтів літнього віку. Супутнє лікування запаморочення вестибулярного походження як доповнення до вестибулярної реабілітації. Симптоматичне лікування шуму у вухах.	Ліверія® IC 	Таблетки №20. UA/13164/01/01	Склад 1 таблетки: метадоксину 0,5 г.	Запобігає накопиченню жирів у гепатоцитах та перешкоджає утворенню фібрoneктину і колагену — гальмує процес формування цирозу печінки.	Комплексна терапія хвороб печінки, особливо алкогольної етіології.
Аміцитрон® Форте Аміцитрон® Форте Без цукру	Порошок для орального розчину №10.	Склад 1 саше: парацетамолу 650 мг, фенілефрину гідрохлориду 10 мг, феніраміну малеату 20 мг, кислоти аскорбінової 50 мг.		Гінкгоба 	Капсули №20, №60. UA/15691/01/01 UA/15691/01/02 UA/15691/01/03	Склад 1 капсули: гінкго екстракту сухого (Folium Ginkgo) (35-67:1) (екстрагент – етанол 65 %)/ (39,6-49,5:1) (екстрагент – етанол 50 %) 40 мг / 80 мг /120 мг.	Препарат збільшує кровотік, нормалізує мікроциркуляцію, підвищує переносимість гіпоксії, запобігає агрегації еритроцитів, гальмує фактор активзації тромбоцитів.	Симптоматичне лікування когнітивних розладів у пацієнтів літнього віку. Супутнє лікування запаморочення вестибулярного походження як доповнення до вестибулярної реабілітації. Симптоматичне лікування шуму у вухах.	Симптоматичне лікування когнітивних розладів у пацієнтів літнього віку. Супутнє лікування запаморочення вестибулярного походження як доповнення до вестибулярної реабілітації. Симптоматичне лікування шуму у вухах.	Мєбікар IC 	Таблетки №20. UA/8823/01/01 UA/8823/01/02	Склад 1 таблетки: темгіколурилу 300 мг / 500 мг.	Знімає або послаблює відчуття занепокоєння, тривоги, страху. Не порушує координацію рухів. Нормалізує перебіг сну. Має антиоксидантну активність та діє як адаптоген та церебропротектор.	Неврози та неврозоподібні стани, що супроводжуються роздратуванням, емоційною лабільністю, відчуттям тривоги та страху; кардіалгії різного генезу; для полегшення перебігу соматовегетативних проявів при передменструальному синдромі та менопаузі.
Аміцитрон® Екстратаб	Таблетки, вкриті плівковою оболонкою №10.	Склад 1 таблетки: парацетамолу 650 мг, фенілефрину гідрохлориду 10 мг, хлорфеніраміну малеату 4 мг.		Депролгін IC 	Порошок для орального розчину №10. UA/20369/01/01	Склад 1 саше: декскетопрофену 25 мг.	Знеболювальний, протизапальний, жарознижувальний засіб.	Слабий або помірно виражений гострий біль, у тому числі м’язово-скелетний біль, менструальний біль, зубний біль.	Мематон IC 	Таблетки №30. UA/16535/01/01 UA/16535/01/02	Склад 1 таблетки: мемантину гідрохлориду 10 мг / 20 мг.	Потенціалозалежний, середньої афінності неконкурентний антагоніст NMDA-рецепторів. Модулює ефекти патологічно підвищених рівнів глутамату, які можуть призвести до дисфункції нейронів.	Хвороба Альцгеймера від легкого ступеня тяжкості до тяжких форм.	
Аміцитрон® плус Аміцитрон® плус Без цукру	Порошок для орального розчину №10. UA/16181/01/01 UA/16182/01/01	Склад 1 саше: парацетамолу 500 мг, гвайфенезину 200 мг, фенілефрину гідрохлориду 10 мг.	Засіб проти кашлю з жарознижувальним, беззаспокійливим та судинозвужувальним ефектами.	Лікування симптомів застуди та грипу: головний біль, біль та ломота у тілі, біль у горлі, закладеність носа, підвищена температура тіла, продуктивний кашель з утрудненим відходженням мокротиння.	Докулак IC 	Таблетки №10. UA/17963/01/02	Склад 1 таблетки: докузату натрію 100 мг.	Проносний засіб, який сприяє проникненню рідини у накопичені тверді, сухі калові маси.	Лікування запорів — для пом’якшення твердих, сухих калових мас, а також для запобігання їх утворення з метою зменшення напруги при дефекації.	Нообут® IC 	Таблетки №20. UA/8831/01/01 UA/8831/01/02 Порошок для орального розчину №10. UA/8831/02/01 UA/8831/02/02	Склад 1 таблетки: фенібуту 100 мг /250 мг. Склад 1 саше: фенібуту 100 мг/ 500 мг.	Стимулює процеси навчання, покращує пам’ять, підвищує фізичну та розумову працездатність. Усуває психоемоційне напруження, тривожність, страх, дратівливість, покращує сон.	Зниження інтелектуальної та емоційної активності, порушення пам’яті, зниження концентрації уваги. Неспокій, страх, тривожність.
Анальгін-Дибазол-Папаверин 	Таблетки №10. UA/15689/01/01	Склад 1 таблетки: метамізолу натрію моногідрату 250 мг, бендазолу гідрохлориду 20 мг, папаверину гідрохлориду 20 мг.	Комбінований препарат з анальгезивним, спазмолітичним, судинорозширювальним, антигіпертензивним та жарознижувальним ефектами.	Больовий синдром, пов’язаний зі спазмом судин або гладких м’язів внутрішніх органів.	Інтагра® IC 	Таблетки №1, №2, №4. UA/12352/01/01 UA/12352/01/02 UA/12352/01/03	Склад 1 таблетки: силденафілу цитрату 25 мг / 50 мг / 100 мг.	Засіб, що застосовується при еректильній дисфункції.	Лікування порушень ерекції, що визначаються як нездатність досягти та підтримати ерекцію статевого члена, необхідну для успішного статевого акту.	Паракод IC® 	Таблетки №10. UA/12054/01/01	Склад 1 таблетки: парацетамолу 500 мг та кодеїну фосфату гемігідрату 8 мг.	Комбінований знеболювальний і жарознижувальний засіб.	Для короткочасного лікування гострого помірного болю.
Інформація в таблиці викладена стисло. Детальна інформація наведена в інструкції для медичного застосування.					Інформація в таблиці викладена стисло. Детальна інформація наведена в інструкції для медичного застосування.					Інформація в таблиці викладена стисло. Детальна інформація наведена в інструкції для медичного застосування.				